Treats up to **5,000** Square Feet

BAYER ADVANCED™

Department of Agriculture STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2011-2013 LIC. NO.

Department of Agriculture STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2014-2016 LIC. NO.

8126.114

WEATHERPROOF PROTECTION
SYSTEMIC FUNGICIDE

Fungus Control for Lawns

READY-TO-SPREAD GRANULES II

CURES & PREVENTS Common Lawn Diseases

Cura y previene las enfermedades frecuentes del césped

¿HABLA ESPAÑOL? VEA EL PANEL TRASERO

- **Controls brown patch, dollar spot, rusts, summer patch, Anthracnose, & other listed diseases**

PROTECTS up to 1 MONTH



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional precautionary statements
FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

Active Ingredient:
Propiconazole†..... 0.51%
Other Ingredients ... 99.49%
Total 100.00%
†CAS# 60207-90-1

Treats up to
5,000 Sq Ft
NET WT 10 LB (4.5 kg)

BAYER ADVANCED

Fungus Control for Lawns

Cures & Prevents Common Lawn Diseases

Fungus Control for Lawns

BAYER ADVANCED

This product cures and prevents turf damaging diseases, and keeps them from invading your lawn. This rainproof formula provides up to 1-month protection against most common lawn diseases including Brown Patch, Dollar Spot, Summer Patch, Rusts and Anthracnose. Keeping your lawn free of listed diseases has never been easier.

READY-TO-SPREAD GRANULES™

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- **Cures and Prevents Common Lawn Diseases**
- **Systemic Fungicide is Absorbed by Grass and Will Not Wash Off**
- **Easy-to-Use Granules**

CONTROLS	Anthracnose, Brown Patch, Dollar Spot, Fusarium Patch, Powdery Mildew, Red Thread, Rusts, Stripe Smut, Summer Patch, and Snow Mold
WHERE TO USE	On lawns
WHEN TO USE	• To treat an existing disease: Apply at first sign of disease • To prevent diseases: Make first application before conditions are favorable for disease.
COVERAGE	• Up to 5,000 square feet (See spreader settings)
	For questions or comments, call toll-free 1-877 BayerAG (1-877-229-3724), or visit us on-line at www.BayerAdvanced.com

FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT:
Propiconazole ..... 0.51 %
OTHER INGREDIENTS: ..... 99.49 %
TOTAL 100.00 %

EPA Reg. No. 72155-81
EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(77) = 070989-MO-001 (46) = 5905-IA-1 (89) = 9198-AL-01
(79) = 5905-GA-01 (68) = 67572-GA-1

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For best results, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE Read and follow these directions when using:	• Do not apply near fish pools, ponds, streams or lakes. • If lawn is very dry, water and let dry before applying.

HOW TO USE

HOW TO APPLY	• Apply product with rotary/drop spreader at rate given below. • Water lawn after application.

CONTROLS	HOW MUCH TO APPLY:	WHEN TO APPLY:
Dollar Spot Anthracnose Brown Patch Powdery Mildew Rusts Red Thread Gray Leaf Spot Melting Out Leaf Spot	**Curative Rate:** 3.5 lbs/1000 sq. ft. (See Spreader Settings Table) **Preventative Rate:** 2 lbs/1000 sq. ft.	**Curative:** Apply at 14-day intervals until control is achieved, then reduce to preventative rate and timing. **Preventative:** Apply at 21-30 day intervals until cooler, drier weather arrives.
Stripe smut		Apply once in spring when grass begins to grow.
Summer Patch	**Preventative Rate:** 3.5 lbs/1000 sq. ft.	Apply at 30 day intervals beginning in spring (mid-May) or 1 month before this disease usually appears in your area.
Take All Patch		Apply in fall or spring to reduce severity of disease.
Fusarium Patch		Apply when conditions are favorable for disease development.
Pink or Gray Snowmold		Apply in late fall before snow cover. Do not apply on top of snow.

FOR BEST RESULTS	Best results are obtained when this product is used as a disease preventative in a complete lawn care program. Most lawn diseases thrive in hot, humid temperatures and under or over fertilized lawns. Thatch build-up also contributes to the problem. Water your lawn in the early morning, never in the late evening. It is best to have a soil test conducted to determine nutrient deficiencies before fertilizing. De-thatch whenever more than 1/2-inch of thatch exists. Mow often at a height recommended for your grass type and the season. For more information on what you can do to control lawn diseases, contact your local County Extension Service (usually found in the white pages of the phone book under the name of your county).
HOW THIS PRODUCT WORKS	Watering after application carries the fungicide into the root zone. It enters the grass through its roots and blades. Rain or water cannot wash off this internal protection!
	Children and pets may re-enter the treated area after it has been watered and allowed to dry.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE	Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.
DISPOSAL	**If Empty:** • Non-refillable container. Do not refill or reuse empty bag. • Place empty bag in trash or offer for recycling if available. **If Partly Filled:** • Call your local solid waste agency or toll-free 1-877-229-3724 for disposal instructions. • Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION — **HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

• Harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through the skin. • Causes moderate eye irritation. • Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. • Avoid breathing dust. • Avoid contact with skin, eyes, or clothing. • Wash thoroughly with soap and warm water after handling.

FIRST AID ✚

IF SWALLOWED	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told by a poison control center or doctor.
IF INHALED	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
IF ON SKIN	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF IN EYES	• Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.
You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information.
Active ingredient: Propiconazole 0.51% (CAS # 60207-90-1).

SPREADER SETTINGS: If your spreader is not listed, please call our toll-free Consumer Service Hotline 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) for help.

GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR: Si su esparcidor no figura en la lista, llamar a la línea gratuita del Servicio al Consumidor en el 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) para obtener ayuda.

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR

Broadcast Spreaders Model / Modelo de esparcidores al voleo	2 lb.Rate Setting / Graduación de tasa de 2 libras (0.9 kg)	3.5 lb.Rate Setting / Graduación de tasa de 3.5 libras (1.5 kg)	Distance Between Passes (Ft.) / Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS BASIC	3.75	5	5
SCOTTS STANDARD	3.5	5.25	6
SCOTTS DELUXE EDGEGUARD	4.5	6	6
VIGORO 10000	6	7	8
VIGORO 15000	3.5	5.5	8/9
Drop Spreaders Model / Modelo de esparcidores por goteo	**2 lb.Rate Setting / Graduación de tasa de 2 libras (0.9 kg)**	**3.5 lb.Rate Setting / Graduación de tasa de 3.5 libras (1.5 kg)**	**Distance Between Passes (Ft.) / Distancia entre las pasadas (pies)**
SCOTTS ACCUGREEN 1000	8.5	9.5	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 2000	7.25	9	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 3000	7.25	9	N/A

Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.
Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly.
Tip: 1000 sq. ft. = 20 x 50 ft

Las graduaciones son aproximadas. El estado de su esparcidor, la velocidad a la que usted camina y el terreno irregular pueden afectar la tasa de aplicación. Calibrar el esparcidor según las indicaciones del fabricante,
No utilizar un esparcidor que aplique los gránulos en bandas angostas, concentradas o irregulares. Asegurarse de que el esparcidor funciona correctamente y disemina los gránulos uniformemente.
Dato: 1000 pies cuadrados (92m2) = 20 x 50 pies

ENVIRONMENTAL HAZARDS

• This pesticide is toxic to fish. • To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. • If rinsing spreader with water, return rinse water into treated areas.

Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions on this label.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Produced for: Bayer Advanced, A Business Unit of Bayer CropScience LP, P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709
Bayer (reg'd), the Bayer Cross (reg'd) and Bayer Advanced™ are trademarks of Bayer
79256221b R.1

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Cura y previene enfermedades frecuentes del césped**
- **La hierba absorbe el fungicida sistémico y no se lava**
- **Gránulos fáciles de utilizar**

CONTROLA	Antracnosis, parche marrón, mancha de dólar, fusariosis, mildiu polvoriento, hilo rojo, roya, tizón rayado, mancha de verano, moho de la nieve.
DÓNDE USAR	En céspedes
CUÁNDO USAR	• Para tratar una enfermedad existente: Aplicar ante el primer signo de la enfermedad. • Para prevenir enfermedades: Realizar la primera aplicación antes de que las condiciones sean favorables para alguna enfermedad.
COBERTURA	• Hasta 5,000 pies cuadrados (460 metros cuadrados) (Ver las graduaciones del esparcidor)
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en línea en www.BayerAdvanced.com

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INGREDIENTE ACTIVO
Propiconazol ..... 0.51 %
OTROS INGREDIENTES ..... 99.49 %
TOTAL 100.00 %

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR Leer y seguir estas indicaciones de uso:	• No aplicar cerca de estanques de peces, lagunas, arroyos o lagos. • Si el césped está muy seco, regar y dejar secar antes de aplicar.

CÓMO USAR

CÓMO APLICAR	• Aplicar el producto con un esparcidor giratorio o de goteo a la tasa que se indica a continuación. • Regar el césped después de la aplicación.

CONTROLA	CUÁNTO APLICAR	CUÁNDO APLICAR
Mancha de dólar Antracnosis Parche marrón Mildiu polvoriento Roya Hilo rojo Mancha gris de la hoja Mal de pie de la mancha de la hoja	**Tasa curativa:** 3.5 libras/1000 pies cuadrados (1,5kg/92 m2) (Ver la Tabla de graduaciones del esparcidor) **Tasa preventiva:** 2 libras/1000 pies cuadrados (0.9kg/92 m2)	**Curación:** Aplicar en intervalos de 14 días hasta lograr el control, luego reducir a la tasa preventiva y el tiempo. **Prevención:** Aplicar en intervalos de 21 a 30 días hasta la llegada del clima más fresco y seco.
Tizón rayado		Aplicar una vez en primavera cuando el césped comienza a crecer.
Mancha de verano	**Tasa preventiva:** 3.5 libras/1000 pies cuadrados (1,5kg/92 m2)	Aplicar en intervalos de 30 días comenzando en primavera (mediados de mayo) o 1 mes antes de la época en que generalmente aparece esta enfermedad en su área.
Pudrición radical		Aplicar en otoño o primavera para reducir la gravedad de la enfermedad.
Fusariosis		Aplicar cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Moho rosa o gris de la nieve		Aplicar a fines del otoño antes de que el césped se cubra de nieve. No aplicar sobre la nieve.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS	Los mejores resultados se obtienen cuando este producto se utiliza como prevención de enfermedades en un programa completo para el cuidado del césped. La mayoría de las enfermedades del césped proliferan en temperaturas cálidas y húmedas y en céspedes con poca fertilización o fertilizados en exceso. La acumulación de paja también contribuye con este problema. Regar el césped a la mañana temprano, nunca a últimas horas de la tarde. Lo más conveniente es realizar una prueba de la tierra para determinar las deficiencias nutricionales antes de fertilizar. Quitar la paja cada vez que se acumule más de 1/2 pulgada (1.3 cm) de paja. Segar con frecuencia a la altura recomendada para el tipo de césped y la estación. Para obtener más información sobre lo que puede hacer para controlar las enfermedades del césped, comuníquese con el Servicio de Extensión del Condado local (generalmente se encuentra en las páginas blancas de la guía telefónica debajo del nombre de su condado).
CÓMO FUNCIONA ESTE PRODUCTO	El riego después de la aplicación traslada el fungicida a la zona de la raíz. Ingresa al césped a través de sus raíces y briznas. La lluvia o el agua no pueden quitar esta protección interna.
	Los niños y mascotas pueden reingresar al área tratada después de que se haya regado y dejado secar.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO	Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave.
ELIMINACIÓN	**Si está vacío:** • Contenedor no reusable. No volver a rellenar ni utilizar la bolsa vacía. • Colocar la bolsa en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible. **Si está parcialmente lleno:** • Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. • Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN — **PELIGROS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

• Es perjudicial si se ingiere, inhala o absorbe por la piel. • Causa irritación moderada de los ojos. • El contacto con la piel prolongado o reiterado frecuentemente puede causar reacción alérgica en algunas personas. • Evitar inhalar el polvo. • Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. • Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto.

PRIMEROS AUXILIOS ✚

EN CASO DE INGESTIÓN	• Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico.
EN CASO DE INHALACIÓN	• Trasladar a la persona a un lugar fresco. • Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia, luego practicar respiración artificial, preferentemente boca a boca si es posible. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para mayores consultas sobre el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL	• Quitar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico inmediatamente para consultas sobre el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS	• Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Al llamar al centro de control de envenenamiento, tener a mano la etiqueta del producto. En caso de buscar ayuda en una sala de emergencias o en el consultorio médico, llevar la etiqueta del producto para mostrarla al personal médico.
Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.
Ingrediente activo: Propiconazol 0.51% (CAS Nº 60207-90-1).

PELIGROS AMBIENTALES

• Este pesticida es tóxico para los peces. • Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar todo producto que haya caído sobre entradas, veredas o la calle para que se mantenga dentro del área tratada del césped o jardín ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe. • Si se enjuaga el esparcidor con agua, regresar el agua del enjuague a las áreas tratadas.

Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. De acuerdo con la ley pertinente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones de esta etiqueta.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

6 87073 01230 9