PREVENTS WEEDS up to 6 MONTHS

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2009-2011 LIC. NO.

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2012-2014 LIC. NO.

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII
LICENSED
PERIOD 2015-2017 LIC. NO.

8126.126

BAYER ADVANCED

Southern

SEASON LONG WEED CONTROL for LAWNS

READY TO SPRAY

Kills Current Weeds

Prevents New Weeds up to 6 Months

Rainproof in 1 Hour

Mata las malezas actuales
Previene las malezas nuevas hasta por 6 meses

ESPAÑOL

- Use on Bermudagrass, Centipede, St. Augustine & Zoysia Lawns
- Won't Harm Lawns†

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional precautionary statements

Active Ingredient:	
2,4-D, dimethylamine salt	4.73%
Isoxaben	2.63%
Mecoprop-p potassium salt	1.10%
Dicamba, potassium salt	0.52%
Other Ingredients	91.02%
Total	100.00%

Treats up to 10,000 Sq Ft

00000000 R.0

NET CONTENTS 32 FL OZ (946ml)

7/01/09

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
4-7/8" (H) x 4-5/32" (W)

Base Label

= Copy Image Area

CCL LABEL MEMPHIS
CCL0897 / 9-19-06 SM

7/06/09

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
BOOK OUTSIDE

3-7/32" | 3-13/32" | 4-7/8"

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN *(continuación)*

PRECAUCIÓN **Peligros para seres humanos y animales domésticos**

- Es perjudicial si se absorbe por la piel o se ingiere.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, fumar o ir al baño.
- Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

FIRST AID ✚

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL	• Quitar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.
EN CASO DE INGESTIÓN	• Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS	• Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos. • Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tener el contenedor o la etiqueta del producto a mano al llamar a un médico, un centro de control de envenenamiento o al concurrir a un tratamiento.
Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.
Ingredientes activos: 4.73% 2,4-D, sal dimetilamina [CAS Nº 2008-39-1], 0.52% dicamba, sal de potasio [CAS Nº 10007-85-9] ,1.10% mecoprop-p, sal de potasio [CAS Nº 66423-05-0] y 2.63% isoxaben [CAS Nº 82558-50-7].

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

BACK COVER
(Last Page)

BAYER ADVANCED

Southern

SEASON LONG WEED CONTROL for LAWNS READY-TO-SPRAY

OPEN Resealable Label for Directions & Precautions

The days of multiple applications to kill weeds are over! Just one application of this product's proprietary 2-in-1 formula kills & prevents lawn weeds up to 6 months! It delivers Season Long Weed Control that's simple and easy to use and it will not harm your lawn when used as directed. Just Hook to Your Hose and Go - Convenient sprayer top connects to garden hose and automatically dispenses the weed killer. Rainproof in one hour. Control weeds in your lawn up to 6 months!

READ THE LABEL FIRST!

Indicaciones en español después de las de inglés

QUICK FACTS

- **Protects Your Lawn from Weeds up to 6 Months**
- **Won't Harm Your Lawn†** • **Rainproof in 1 Hour**
- **Attach to Hose and Spray**

KILLS & PREVENTS	Kills over 200 broadleaf weeds such as Dollarweed, Chickweed, Dandelion, Henbit, Clover & Spurge Prevents New Weeds from Coming Back up to 6 Months
WHEN TO USE	Apply Anytime - Spring or Fall
WHERE TO USE	ON ESTABLISHED SOUTHERN LAWNS without harming lawn grasses †(Do not use on Carpetgrass, Floratam variety of St. Augustinegrass, Dichondra or desirable clovers.)
HOW TO USE	To prevent new weeds from growing, spray entire area you want protected. Wait 2 days after applying, then activate residual barrier by watering. See Directions for Use for further details.
COVERAGE	This bottle treats up to 10,000 sq. ft. (10,000 sq. ft. for Centipede & St. Augustine lawns; 5,000 sq. ft. for Bermudagrass and Zoysia lawns). Just hook to garden hose and go.
☎ 💻	For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit our website at www.BayerAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENTS:

2,4-D, dimethylamine salt (CAS No. 2008-39-1)	4.73%
Isoxaben (CAS No. 82558-50-7)	2.63%
Mecoprop-p, potassium salt (CAS No. 66423-05-0)	1.10%
Dicamba, potassium salt (CAS No. 10007-85-9)	0.52%
OTHER INGREDIENTS	91.02%
TOTAL	100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:
0.337 lb 2,4-D acid equivalent per gal or 3.94%
0.225 lb Isoxaben per gal or 2.63%
0.080 lb Mecoprop-p acid equivalent per gal or 0.94%
0.038 lb Dicamba acid equivalent per gal or 0.44%
Isomer Specific by AOAC Method

FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

EPA Reg. No. 72155-87
EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 432-TX-1
(39) = 58996-MO-1
(49) = 072155-AL-001
(13) = 071106-GA-001

FPO

6 4

00000000 R.0

3-21/32"

FRONT COVER
(Page1)

= Copy Image Area

7/06/09

CCL LABEL MEMPHIS
CCL0897 / 9-19-06 SM

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
BOOK INSIDE

3-7/32"

4-7/8'

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

BEFORE YOU USE

- Use this product only on established lawns.
- Apply when the air is calm to avoid spray drift onto desirable plants.

HOW MUCH TO USE

- Measure area to be sprayed. Calculate 'square feet' by multiplying length times width.
- **Bermudagrass, Buffalograss, Fescue, Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass, Zoysiagrass – this bottle (32 fl. oz.) treats 5,000 sq. ft.**
- **Bahiagrass, Centipedegrass, St. Augustinegrass (not for use on Floratam variety) or mixtures containing one or more of these grasses – this bottle (32 fl. oz.) treats 10,000 sq. ft.**
- The maximum application rate of this product is 32 fl. oz. per 5,000 sq. ft. per application per site. The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

HOW TO USE
Shake Well Before Use

- **To prevent new weeds from growing, you must spray the entire area you want protected, not just the emerged weeds.**
- **Wait 2 days after applying then activate residual barrier by watering with 1/4 - 1/2" of irrigation.**

CONNECT
1. Shake well before use.
2. Connect sprayer to garden hose.
3. Turn on water.

SPRAY
1. Extend hose to farthest area to be treated, point sprayer nozzle in direction to be sprayed.
2. Begin spraying – Push & hold lock tab away from knob, use other hand to turn knob clockwise to ON position.

3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap the treated areas. Work back toward the faucet to avoid walking over wet, treated grass.

FINISH
1. To stop spraying, push & hold lock tab away from knob and use other hand to turn knob counter-clockwise to OFF position.

2. Turn off water at faucet.
3. Relieve water pressure in hose by turning sprayer back to ON position until water slows to a drip then turn sprayer OFF.
4. Disconnect sprayer from hose.

DIRECTIONS FOR USE *(cont'd)*

FOR BEST RESULTS

WHEN TO APPLY:
- Spray when
  - weeds are small and actively growing
  - temperatures are between 50 - 90°F
- Do not apply while grass is emerging from dormancy.
- Certain hard-to-kill weeds may be retreated in 2 weeks if necessary. Spray individual weeds using Southern Season Long Weed Control for Lawns Concentrate.
- Heavy raking will disturb the weed preventative barrier and reduce the effectiveness of this product.
- Newly seeded lawn may be sprayed after fourth mowing.
- Bare spots may be seeded 60 days after application.

MOWING:
- Do not mow for 1 to 2 days after spraying.
- Clippings from the first three mowings should be left on the treated area. Do not use clippings from the treated areas as mulch or compost around flowers, ornamentals, trees, or in vegetable gardens.

WATERING:
- If lawn is dry, water 1 to 2 days before using this product.
- Rain or watering 1 hour after application will not wash away effectiveness.

HOW IT WORKS

This product contains a proven blend of three weed killers to kill existing weeds PLUS a residual herbicide to keep them from coming back for up to 6 months. Weeds begin to wilt & die within hours and are completely dead in 14 – 28 days. And, it won't harm your lawn when used as directed.

KILLS (a "1" indicates *Kills & Prevents*)

Annual Yellow Sweetclover	Blue Vervain	Buttonweed
Aster	Bracted Plantain[1]	Canada Thistle
Austrian Fieldcress	Brassbuttons	Carolina Geranium
Bedstraw	Bristly Oxtongue	Carpetweed
Beggarticks	Broadleaf Dock	Catchweed Bedstraw
Betony, Florida	Broadleaf Plantain	Catnip
Bindweed, Field	Broomweed	Catsear
Bird Vetch	Buckhorn	Chickweed, Common[1]
Bitter Wintercress	Buckhorn Plantain	Chickweed, Mouseear
Bittercress, Hairy[1]	Bulbous Buttercup	Chicory
Bitterweed	Bull Thistle	Cinquefoil
Black-eyed Susan	Bullnettle	Clover[1]
Black Medic	Burclover	Clover, Crimson[1]
Black Mustard	Burdock	Clover, Hop[1]
Blackseed Plantain	Burning Nettle	Clover, Red[1]
Blessed Thistle	Burweed[1]	
Bloodflower Milkweed	Buttercup	
Blue Lettuce		

3-21/32"

Page 2

Page 3

= Copy Image Area

7/06/09

CCL LABEL MEMPHIS
CCL0897 / 9-19-06 SM

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
BOOK INSIDE

3-7/32"

4-7/8"

KILLS (a "1" indicates *Kills & Prevents*) *(cont'd)*

Clover, Strawberry[1]
Clover, Sweet[1]
Clover, White[1]
Cockle
Cocklebur
Common Mullein
Creeping Charlie
Creeping Jenny
Cudweed[1]
Curly Dock
Daisy, English
Daisy, Fleabane
Daisy, Oxeye
Dandelion[1]
Dichondra
Dogbane
Dogfennel
Dollarweed[1]
Elderberry
False Dandelion[1]
False Flax
False Sunflower
Fiddleneck[1]
Florida Pusley
Frenchweed
Galinsoga
Goathead
Goldenrod
Ground Ivy
Gumweed
Hairy Fleabane[1]
Hawkweed
Healall
Heartleaf Drymary
Heath Aster
Hedge Bindweed
Hedge Mustard
Hemp
Henbit[1]
Hoary Cress
Hoary Plantain
Hoary Vervain
Horsenettle
Jimsonweed
Knawel
Knotweed
Kochia
Lambsquarters[1]
Lespedeza
Mallow[1]
Matchweed
Mexicanweed
Milk Vetch
Morningglory
Mouseear Hawkweed
Mugwort
Musk Thistle
Mustard
Narrowleaf Plantain
Narrowleaf Vetch
Nettle
Orange Hawkweed
Oriental Cocklebur
Oxalis[1]
Parsley-piert[1]
Parsnip
Pearlwort
Pennycress
Pennywort[1]
Pepperweed
Pigweed[1]
Pineywoods Bedstraw
Plains Coreopsis (Tickseed)
Plantain[1]
Poison Ivy
Poison Oak
Pokeweed
Poorjoe
Prairie Sunflower
Prickly Lettuce[1]
Prickly Sida
Prostrate Knotweed[1]
Prostrate Pigweed
Prostrate Spurge
Prostrate Vervain
Puncturevine
Purslane, Common[1]
Ragweed[1]
Red Sorrel
Redroot Pigweed
Redstem Filaree[1]
Rough Cinquefoil
Rough Fleabane[1]
Russian Pigweed
Russian Thistle[1]
Scarlet Pimpernel
Scotch Thistle
Sheep Sorrel
Shepherdspurse[1]
Slender Plantain
Smallflower Galinsoga
Smooth Dock
Smooth Pigweed
Sorrel
Sowthistle[1]
Spanishneedles
Speedwell[1]
Spiny Amaranth
Spiny Cocklebur
Spiny Sowthistle
Spotted Catsear
Spotted Spurge[1]
Spurweed
Stinging Nettle
Strawberry, India Mock
Tall Nettle
Tall Vervain
Tansy Mustard
Tanweed
Thistle
Trailing Crownvetch
Tumble Mustard
Tumble Pigweed
Velvetleaf[1]
Venice Mallow

Page 4

KILLS (a "1" indicates *Kills & Prevents*) *(cont'd)*

Virginia Buttonweed
Virginia Creeper
Virginia Pepperweed[1]
Water Pennywort
Wavyleaf Bullthistle
Western Clematis
Western Salsify
White Mustard
Wild Aster
Wild Buckwheat
Wild Carrot
Wild Four-o'clock
Wild Garlic
Wild Geranium
Wild Lettuce
Wild Marigold
Wild Mustard[1]
Wild Onion[1]
Wild Parsnip
Wild Radish[1]
Wild Rape
Wild Strawberry
Wild Sweet Potato
Wild Vetch
Woodsorrel[1]
Wooly Croton
Wooly Morningglory
Wooly Plantain
Wormseed
Yarrow
Yellow Rocket
Yellowflower Pepperweed
and other broadleaf weeds

[1]*Kills & Prevents*

Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried.

IMPORTANT-Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

DISPOSAL

If Empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.
If Partly Filled: Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water.
- Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

3-21/32"

Page 5

7/06/09

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
BOOK INSIDE

3-7/32"

4-7/8"

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Protege su césped de las malezas hasta por 6 meses**
- **No daña el césped†**
- **A prueba de lluvia en 1 hora**
- **Conectar a la manguera y rociar**

MATA Y PREVIENE	Mata más de 200 malezas de hoja ancha como el sombrerito de agua, capiquí, diente de león, ortiga mansa, trébol y lechetrezna Previene el regreso de nuevas malezas hasta por 6 meses
CUÁNDO USAR	Aplicar en cualquier época: primavera u otoño
DÓNDE USAR	SOBRE CÉSPEDES DEL SUR ESTABLECIDOS sin dañar la hierba †(No utilizar sobre la grama colorada, la variedad 'Floratam' del césped San Agustín, dichondra o los tréboles que desee conservar.)
CÓMO USAR	Para evitar que crezcan nuevas malezas, rociar toda el área que desea proteger. Esperar 2 días después de la aplicación; luego, regar para activar la barrera residual. Consultar las Indicaciones de uso para obtener más detalles.
COBERTURA	Esta botella trata hasta 10,000 pies cuadrados (900 m2) (10,000 pies cuadrados (900 m2) para hierba Centipede y césped San Agustín; 5,000 pies cuadrados (450 m2) para céspedes Bermuda y Zoysia). Sólo se debe conectar la manguera y listo.
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en nuestro sitio Web www.BayerAdvanced.com

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INGREDIENTES ACTIVOS:		ESTE PRODUCTO CONTIENE:
2,4-D, sal dimetilamina (CAS Nº 2008-39-1)	4.73%	0.337 libras (153 g) de 2,4-D equivalente ácido por galón o 3.94%
Isoxaben (CAS Nº 82558-50-7)	2.63%	0.225 libras (102 g) de isoxaben por galón o 2.63%
Mecoprop-p, sal de potasio (CAS Nº 66423-05-0)	1.10%	0.080 libras (36 g) de mecoprop-p equivalente ácido por galón o 0.94%
Dicamba, sal de potasio (CAS Nº 10007-85-9)	0.52%	0.038 libras (15 g) de dicamba equivalente ácido por galón o 0.44%
OTROS INGREDIENTES	91.02%	Isómero específico por Métodos AOAC
TOTAL	100.00%	

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

ANTES DE USAR	• Aplicar este producto sólo sobre césped establecido. • Aplicar cuando el viento esté calmo para evitar que el rocío se esparza sobre las plantas que desee conservar.
CUÁNTO USAR	• Medir el área a rociar. Para calcular los "pies cuadrados" (metros cuadrados), multiplicar el largo por el ancho. • **Césped Bermuda, hierba búfalo, cañuela, pasto azul de Kentucky; ballico perenne, césped Zoysia – esta botella (32 onzas líquidas (1000 cc)) trata 500 pies cuadrados (450 metros cuadrados).** • **Césped Bahía, hierba Centipede, césped San Agustín (no usar en la variedad Floratam) o mezclas que contengan uno o más de estos céspedes – esta botella (32 onzas líquidas (1000 cc)) trata 10,000 pies cuadrados (900 metros cuadrados).** • La tasa máxima de aplicación de este producto es de 32 onzas líquidas (1000 cc) cada 5,000 pies cuadrados (450 metros cuadrados) de aplicación por sitio. La cantidad máxima de aplicaciones por esparcimiento por sitio de tratamiento es de 2 por año.
CÓMO USAR **Agitar bien la botella antes de usar**	• **Para evitar que crezcan nuevas malezas, debe rociar el área completa que desea proteger, no sólo las malezas que ya surgieron.** • **Esperar 2 días después de aplicar; luego, rociar con 1/4 ó 1/2" pulgada (0.6 cm ó 1.3 cm) de irrigación para activar la barrera residual.** **CONEXIÓN** 1. Agitar bien antes de usar. 2. Conectar el rociador a la manguera del jardín. 3. Abrir el grifo de agua. **PARA ROCIAR** 1. Extender la manguera hasta el área más lejana a tratar y apuntar la boquilla del rociador en la dirección a rociar. 2. Comenzar a rociar. Presionar la lengüeta de cierre utilizando la mano libre para girar la válvula del rociador en el sentido de las agujas del reloj a la posición "ON". 3. Caminar a paso lento constante a medida que rocía, utilizar un movimiento de barrido parejo y superponer levemente las áreas tratadas. Trabajar de espaldas al grifo para evitar caminar sobre el césped mojado ya tratado. *(continuación)*

Page 6

3-21/32"

Page 7

7/06/09

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
BOOK INSIDE

3-7/32"

4-7/8"

INDICACIONES DE USO *(continuación)*

CÓMO USAR *(continuación)*

AL FINAL

1. Para dejar de rociar, presionar la lengüeta de cierre utilizando la mano libre para girar la válvula del rociador en el sentido opuesto a las agujas del reloj a la posición "OFF".
2. Cerrar el grifo de agua.
3. Reducir la presión de agua de la manguera girando el rociador nuevamente a la posición "ON" hasta que el agua lentamente gotee y luego gire el rociador a la posición "OFF".
4. Desconectar el rociador de la manguera del jardín.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

CUÁNDO APLICAR:

- Rociar cuando
  - las malezas son pequeñas y están en crecimiento activo
  - las temperaturas oscilan entre 50 y 90° F (10° C y 32° C)
- No aplicar mientras el césped retorna del letargo.
- Es posible que determinadas malezas difíciles de eliminar deban volver a tratarse en 2 semanas, si fuera necesario. Rociar las malezas individuales utilizando el concentrado para el control de la malezas durante toda la temporada en céspedes del sur Southern Season Long Weed Control for Lawns Concentrate
- Rastrillar excesivamente alterará la barrera preventiva de malezas y reducirá la eficacia de este producto.
- El césped recién sembrado puede rociarse después de segarlo por cuarta vez.
- Los puntos descubiertos pueden sembrarse 60 días después de la aplicación.

SEGADO:

- No segar por 1 ó 2 días después de rociar.
- Los recortes de césped de los primeros tres segados deben dejarse en el área tratada. No utilizar los recortes de las áreas tratadas como mantillo o abono orgánico alrededor de flores, plantas ornamentales, árboles o en jardines de hortalizas.

RIEGO:

- Si el césped está seco, regar 1 ó 2 días después de utilizar este producto.
- La lluvia o riego una hora después de la aplicación no afectará la eficacia del producto.

CÓMO FUNCIONA

Este producto contiene una mezcla probada de tres herbicidas para matar las malezas existentes ADEMÁS de un herbicida residual para evitar que regresen hasta por 6 meses. Las malezas comienzan a marchitarse y mueren en horas y están completamente muertas en 14 a 28 días. Y no daña su césped cuando es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Page 8

INDICACIONES DE USO *(continuación)*

MATA (un "1" significa *Mata y previene*)

- Trébol amarillo
- Aster
- Rorippa austriaca
- Galium
- Aceitilla
- Stachys floridana
- Manto blanco
- Vicia cracca
- Berro de altura
- Falso berro[1]
- Helenium tenuifolium
- Alma del poeta
- Lupilina
- Mostaza negra
- Plántago rugelii
- Cardo santo
- Hierba de la cucaracha
- Lechuga azul
- Verbena azul
- Plántago aristata[1]
- Cotula
- Cardo perruno
- Lengua de vaca
- Plántago mayor
- Gutierrezia dracunculoides
- Tritogonia verrucosa
- Llantén menor
- Hierba velluda
- Cardo negro
- Mala mujer
- Trébol de carretilla
- Bardana
- Ortiga mayor
- Cadillo[1]
- Celidonia menor
- Hierba del soldado
- Calcida vera
- Geranio
- Verdolaga alfombra
- Galium aparine
- Hierba gatera
- Hierba del halcón
- Capiqui común[1]
- Cerastium vulgatum
- Endivia
- Tormetilla
- Trébol[1]
- Trébol encarnado[1]
- Trifolium agrarium[1]
- Trébol rojo[1]
- Trébol fresa[1]
- Trébol dulce[1]
- Trébol blanco[1]
- Berbecho
- Bardana menor
- Barbasco
- Pilea nummulariifolia
- Lysimachia nummularia
- Vira Vira[1]
- Romaza
- Margarita menor
- Erigeron philadelphicus
- Margarita mayor
- Diente de león[1]
- Dichondra
- Verdolaga de la montana
- Manzanilla cimarrona
- Sombrerito de agua[1]
- Baya del saúco
- Falso diente de león[1]
- Camelina
- Falso girasol
- Amsinckia menziesii var[1]
- Botoncillo
- Carraspique
- Galinsoga
- Abrojos
- Vara de oro
- Hiedra de tierra
- Pegapega
- Rama negra[1]
- Flor de peña
- Cola de ratón
- Cinquillo
- Aster ericoides
- Campanilla Blanca
- Erísimo
- Cáñamo común
- Ortiga mansa[1]
- Antoñico
- Llantén media
- Verbena stricta
- Solanum de Carolina
- Belladona
- Escleranto
- Sanguinaria
- Morenita
- Cenizos[1]
- Lespedeza
- Malva[1]
- Escobilla
- Caperonia castaneifolia
- Astrágalo
- Campanilla
- Oreja de ratón
- Artemisa
- Cardo pendiente
- Mostaza
- Plántago de hoja delgada
- Veza común
- Ortiga
- Naranja de la vellosilla
- Bardana menor
- Oxalis[1]
- Alquimila arvense[1]
- Chirivía
- Sagina procumbens
- Carraspique
- Obolaria virginica[1]
- Lentejilla
- Bledo[1]

3-21/32"

Page 9

7/06/09

Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
BOOK INSIDE

3-7/32”

4-7/8”

MATA (un “1” significa *Mata y previene*) *(continuación)*

Pineywoods Bedstraw
Coreopsos tinctoria (pilosa de Bidens)
Plántago[1]
Hiedra venenosa
Roble venenoso
Hierba carmín
Diodia teres
Girasol silvestre
Lactuca serviola[1]
Afata hembra
Centinodia[1]
Bledo rojo
Hierba de golondrina
Verbena bracteata
Abrojos
Verdolaga[1]
Ambrosia[1]
Rumex acetosella
Yuyo colorado
Alfilerillo[1]
Potentilla norvegica
Erigeron asperugineus[1]
Axyris amaranthoides
Cardo ruso[1]
Pimpinela escarlata
Cardo escocés
Amargosa
Bolsa del pastor[1]
Plantago heterophylla
Galinsoga parviflora
Rumex altissimus
Amaranthus hybridus
Acedera
Achicoria[1]
Bidens bipinnata
Verónica[1]
Bledo espinoso
Cepa caballo
Cerraja brava
Pasto del chancho
Euphorbia maculata[1]
Soliva sessilis
Ortiga mayor
Fresa de la India
Urtica procera
Verbena lila
Pamita
Polígono anfibio
Cardo
Coronilla varia
Nabo chileno
Quelite
Malva blanca[1]
Hibisco
Diodia virginiana
Parra virgen
Lentejilla[1]
Centella asiática
Wavyleaf Bullthistle
Clemátide
Salsafi
Mostaza blanca
Aster silvestre
Enredadera (Polygonum Convolvulus)
Zanahoria silvestre
Maravilla
Ajo silvestre
Geranio silvestre
Lechuga silvestre
Caléndula silvestre
Mostaza silvestre[1]
Cebolla silvestre[1]
Chirivía silvestre
Rábano silvestre[1]
Colza silvestre
Fresa silvestre
Batata silvestre
Vicia americana
Oxalis montana[1]
Croton capitatus
Palo de rosa
Hierba del pastor
Chenopodium aristatum
Milenrama
Hierba de Santa Bárbara
Mastuerzo
y otras malezas de hoja ancha

[1]Mata y previene

No aplicar este producto de manera que entre en contacto con personas o mascotas, directamente o a través del escurrimiento. Mantener a las personas y a las mascotas alejadas del área durante la aplicación. No permitir a las personas ni a las mascotas ingresar al área tratada hasta que el rocío se haya secado.

IMPORTANTE: Indicaciones para almacenamiento y eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento

ELIMINACIÓN

Si está vacío: Contenedor no rellenable. No volver a utilizar ni rellenar este contenedor. Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.
Si está parcialmente lleno: Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PELIGROS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente al agua.
- El rocío o el escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos presentes en las aguas adyacentes a las áreas tratadas. No contaminar el agua al eliminar el agua de lavado o enjuague del equipo.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento a los cuerpos de agua o los sistemas de desagüe.

Page 4

3-21/32”

Page 5

7/06/09