# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# 4-7/8” (H) x 4-5/32” (W) - Base Label

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII

LICENSED

PERIOD 2012-2014 LIC. NO.

Department of Agriculture
STATE OF HAWAII

LICENSED

PERIOD 2015-2017 LIC. NO.

8126.133

3-29/32”

4-5/8”

4-7/8”

4-5/32”

Pantone Yellow- substitute for process yellow

Process Magenta

Process Cyan

Process Black

P-286C

P-151C

P-1797C

CCL LABEL MEMPHIS

CCL0896 / 9-15-06 BB

11/30/09

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# 4-7/8” (H) x 4-5/32” (W)

## Base Label

7/16” ← 3-9/32” → 7/16”

4-5/8” ↕ 4-7/8” ↕

BAYER ADVANCED

**Weed Killer for Lawns**

READY-TO-SPRAY

**PRECAUTIONARY STATEMENTS (cont’d)**

**CAUTION** **Hazards to Humans and Domestic Animals**

- Harmful if absorbed through skin or if swallowed.
- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with eyes, skin or clothing.
- When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves.

**After using this product:**

- Rinse gloves before removing.
- Remove clothing and launder separately before reuse.
- Wash hands thoroughly with soap and water.
- If product gets on clothing, remove clothing as soon as possible and shower.

**FIRST AID ✚**

| | |
|---|---|
| **IF SWALLOWED** | • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.<br>• Have person sip a glass of water if able to swallow.<br>• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.<br>• Do not give anything to an unconscious person. |
| **IF IN EYES** | • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.<br>• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.<br>• Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| **IF ON SKIN OR CLOTHING** | • Take off contaminated clothing.<br>• Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes.<br>• Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| **IF INHALED** | • Move person to fresh air.<br>• If not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.<br>• Call a poison control center or doctor for further treatment advice. |

**NOTE:** When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor’s office, bring this product label to show medical personnel. **You may call toll-free 877-229-3763 for medical emergency information.** Active Ingredients: 7.59% 2,4-D, dimethylamine salt [CAS # 2008-39-1], 1.83% Mecoprop-p, dimethylamine salt [CAS # 66423-09-4], and 0.84% Dicamba, dimethylamine salt [CAS # 2300-66-5].

**NOTICE :** Research and testing have determined that the “Directions For Use” are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

***Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Produced for: Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709

EPA Reg. No. 72155-4
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (75) = 5905-AR-1 (71) = 2217-KS-2
(39) = 58996-MO-1 (57) = 071106-GA-003

Bayer (reg’d), Bayer Cross (reg’d), and Bayer Advanced™ are trademarks of Bayer.

PRESS TO RESEAL

79873301b R.1

4-5/32” ←→

= Copy Image Area

6/28/11

CCL LABEL MEMPHIS
CCL0897 / 9-19-06 SM

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# BOOK OUTSIDE

3-7/32”

## PRIMEROS AUXILIOS ✚

| | |
|---|---|
| **EN CASO DE INGESTIÓN** | • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.<br>• Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.<br>• No inducir el vómito a menos que lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.<br>• No administrar nada por boca a una persona inconsciente. |
| **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS** | • Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos.<br>• Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos.<br>• Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. |
| **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA** | • Quitar la ropa contaminada.<br>• Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.<br>• Llamar a un médico o un centro de control de envenenamiento para obtener asesoramiento médico. |
| **EN CASO DE INHALACIÓN** | • Trasladar a la persona a un lugar fresco.<br>• Si hay paro respiratorio, llamar al 911 o a una ambulancia, luego proporcionar respiración artificial, preferentemente de boca a boca, si fuera posible.<br>• Llamar a un médico o un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento. |

**NOTA:** Al llamar a un centro de control de envenenamiento, tener la etiqueta del producto a mano. En caso de solicitar tratamiento en una sala de emergencias o consultorio médico, llevar la etiqueta del producto para mostrarla al personal médico. **Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 877-229-3763.** Ingredientes activos: 7.59% 2,4-D, sal dimetilamina [CAS Nº 2008-39-1], 1.83% mecoprop-p, sal dimetilamina [CAS Nº 66423-09-4] y 0.84% dicamba, sal dimetilamina [CAS Nº 2300-66-5].

**NOTA:** Investigaciones y pruebas han determinado que las “Indicaciones de uso” son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

***Garantía de devolución de dinero:** Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

**BACK COVER**
**(Last Page)**

3-13/32”

BAYER ADVANCED

# Weed Killer for Lawns

READY-TO-SPRAY

OPEN Resealable Label for Directions & Precautions

***This product kills over 200 types of broadleaf weeds. This formula kills Dandelion, Clover and Chickweed without harming your lawn†. Controlling weeds in your lawn has never been easier. Attach to hose and spray.***

**READ THE LABEL FIRST!**

## QUICK FACTS

READ LABEL FIRST

Indicaciones en español después de las de inglés

- **Kills over 200 broadleaf weeds****
- **Won’t Harm Your Lawn†** • **Treats 8,000 sq. ft.**

| | |
|---|---|
| **KILLS** | Over 200 broadleaf weeds such as Dandelion, Clover, Chickweed and other listed weeds.<br>**as listed on this label |
| **WHERE TO USE** | **On Lawns**<br>†(When used as directed. Do not use on Carpetgrass, Dichondra or Floratam variety of St. Augustinegrass.) |
| **WHEN TO USE** | When weeds are actively growing. |
| **HOW MUCH TO USE** | **Northern Lawns:**<br>Fescue, Kentucky Bluegrass, and Perennial Ryegrasses<br>**and Hardy Southern Lawns:**<br>Bermuda, Buffalo and Zoysia grasses<br>One qt treats 8,000 sq. ft.<br>**No measuring needed. Dilutes automatically.** |
| | For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit our website at www.BayerAdvanced.com. |

**FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY**

**ACTIVE INGREDIENTS:**

| | |
|---|---|
| 2,4-D, dimethylamine salt | 7.59% |
| Mecoprop-p, dimethylamine salt | 1.83% |
| Dicamba, dimethylamine salt | 0.84% |
| **OTHER INGREDIENTS** | 89.74% |
| **TOTAL** | 100.00% |

THIS PRODUCT CONTAINS:
0.00427 lb 2,4-D acid equivalent per fl. oz. or 6.30%
0.00102 lb Mecoprop-p acid equivalent per fl. oz. or 1.51%
0.00047 lb Dicamba acid equivalent per fl. oz. or 0.69%
Isomer Specific by AOAC Method

EPA Reg. No. 72155-4
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (75) = 5905-AR-1
(71) = 2217-KS-2 (39) = 58996-MO-1
(57) = 071106-GA-003

6 87073 04170 5

79873301b R.1

4-7/8”

3-21/32”

**FRONT COVER**
**(Page1)**

= Copy Image Area

6/28/11

CCL LABEL MEMPHIS
CCL0897 / 9-19-06 SM

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# BOOK INSIDE

3-7/32”

4-7/8”

## DIRECTIONS FOR USE

**It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.**

**Read and follow all label directions.**

**Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.**

**Not for use on turf being grown for sale or other commercial use as sod, or for commercial seed production or for research purposes.**

**Do not apply through any type of irrigation system.**

**BEFORE YOU USE**
**Read and follow directions when using.**

- Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans. Do not apply when windy. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day. Rinse applicator over lawn or garden area only.
- Spray when most of the day is expected to remain cooler than 90˚ F.
- Do not use this product on or near desirable plants, including within the dripline of desirable trees and shrubs, since injury may result
- The maximum number of broadcast applications per treatment site is two per year.

**HOW TO USE**
**Shake Well Before Use**

**CONNECT**
1. Shake well before use.
2. Connect sprayer to garden hose.
3. Turn on water.

**SPRAY**
1. Extend hose to farthest area to be treated, point sprayer nozzle in direction to be sprayed.
2. Begin spraying – Press lock tab while using other hand to turn sprayer valve to ON position.
3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap the treated areas. Work back toward the faucet to avoid walking over wet, treated grass.

**FINISH**
1. To stop spraying, Press lock tab while using other hand to turn sprayer valve to OFF position.
2. Turn off water at faucet.
3. Relieve water pressure in hose by turning sprayer valve back to ON position until water slows to a drip then turn sprayer valve to OFF position.
4. Disconnect sprayer from hose.

*(cont'd)*

## DIRECTIONS FOR USE *(cont'd)*

**HOW TO USE** *(cont'd)*

**Application Restrictions:**
- Limited to **2 applications per year** with a **30 day interval** between applications
- **Maximum single application rate** of 8.0 fl. oz./1,000 sq. ft. (1.47 lbs 2,4-D ae, 0.35 lb MCPP-p ae and 0.16 lb dicamba ae per acre per application)
- **Maximum seasonal rate** of 16.0 fl. oz./1,000 sq. ft. (2.94 lbs 2,4-D ae, 0.71 lb MCPP-p ae and 0.33 lb dicamba ae per acre per application)

### TIPS FOR APPLYING

**HOW TO APPLY**
1. Extend hose to the farthest area to be treated and work back toward the faucet to avoid walking over wet, treated grass.
2. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, slightly overlapping the treated areas.

**FOR BEST RESULTS**
- Apply when weeds are young and actively growing.
- If the lawn is dry, water 24 hours before using this product.
- Rain or watering one hour after application will not wash away effectiveness.
- Apply 1 to 3 days after mowing.
- Certain hard-to-kill weeds may need to be spot-treated in 30 days.
- Do not apply to new lawns until the grass has reached a height of at least 2 inches.
- Bare spots may be seeded 3 to 4 weeks after application.

**HOW THIS PRODUCT WORKS**
This product is a selective herbicide - it selectively kills weeds in the lawn but won't harm the lawn itself. It is a blend of proven weed killers designed to get broadleaf weeds such as dandelion, clovers and chickweed.

### KILLS

**Annual yellow sweetclover**
**Aster**
**Austrian fieldcress**
**Bedstraw**
**Beggarticks**
**Betony, Florida**
**Bindweed, field**
**Bird vetch**
**Bitter wintercress**
**Bittercress, hairy**
**Bitterweed**
**Black-eyed Susan**
**Black medic**
**Black mustard**
**Blackseed plantain**
**Blessed thistle**
**Bloodflower milkweed**
**Blue lettuce**
**Blue vervain**
**Bracted plantain**
**Brassbuttons**
**Bristly oxtongue**
**Broadleaf dock**
**Broadleaf plantain**
**Broomweed**
**Buckhorn**
**Buckhorn plantain**
**Bulbous buttercup**
**Bull thistle**
**Bullnettle**
**Burclover**
**Burdock**
**Burning nettle**
**Burweed**
**Buttercup**
**Buttonweed**
**Canada thistle**
**Carolina geranium**
**Carpetweed**
**Catchweed bedstraw**
**Catnip**
**Catsear**
**Chickweed, common**
**Chickweed, mouseear**
**Chicory**
**Cinquefoil**
**Clover, crimson**

*(cont'd)*

3-21/32”

**Page 2**

**Page 3**

= Copy Image Area

**6/28/11**

**CCL LABEL MEMPHIS**
**CCL0897 / 9-19-06 SM**

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# BOOK INSIDE

3-7/32”

4-7/8”

## KILLS *(cont'd)*

Clover, hop
Clover, red
Clover, strawberry
Clover, sweet
Clover, white
Cockle
Cocklebur
Common mullein
Creeping Charlie
Creeping Jenny
Cudweed
Curly dock
Daisy, English
Daisy, fleabane
Daisy, oxeye
Dandelion
Dichondra
Dogbane
Dogfennel
Dollarweed
Elderberry
False dandelion
False flax
False sunflower
Fiddleneck
Florida pusley
Frenchweed
Galinsoga
Goathead
Goldenrod
Ground ivy
Gumweed
Hairy fleabane
Hawkweed
Healall
Heartleaf drymary
Heath aster
Hedge bindweed
Hedge mustard
Hemp
Henbit
Hoary cress
Hoary plantain
Hoary vervain
Horsenettle
Jimsonweed
Knawel
Knotweed
Kochia
Lambsquarters
Lespedeza
Mallow
Matchweed
Mexicanweed
Milk vetch
Morningglory
Mouseear hawkweed
Mugwort
Musk thistle
Mustard
Narrowleaf plantain
Narrowleaf vetch
Nettle
Orange hawkweed
Oriental cocklebur
Oxalis
Parsley-piert
Parsnip
Pearlwort
Pennycress
Pennywort
Pepperweed
Pigweed
Pineywoods bedstraw
Plains coreopsis (tickseed)
Plantain
Poison ivy
Poison oak
Pokeweed
Poorjoe
Prairie sunflower
Prickly lettuce
Prickly sida
Prostrate knotweed
Prostrate pigweed
Prostrate spurge
Prostrate vervain
Puncturevine
Purslane, common
Ragweed
Red sorrel
Redroot pigweed
Redstem filaree
Rough cinquefoil
Rough fleabane
Russian pigweed
Russian thistle
Scarlet pimpernel
Scotch thistle
Sheep sorrel
Shepherdspurse
Slender plantain
Smallflower galinsoga
Smooth dock
Smooth pigweed
Sorrel
Sowthistle
Spanishneedles
Speedwell
Spiny amaranth
Spiny cocklebur
Spiny sowthistle
Spotted catsear
Spotted spurge
Spurweed
Stinging nettle
Strawberry, India mock
Tall nettle
Tall vervain
Tansy mustard
Tanweed
Thistle
Trailing crownvetch
Tumble mustard
Tumble pigweed
Velvetleaf
Venice mallow
Virginia buttonweed
Virginia creeper
Virginia pepperweed
Water pennywort
Wavyleaf bullthistle
Western clematis
Western salsify
White mustard
Wild aster

*(cont'd)*

Page 4

## KILLS *(cont'd)*

Wild buckwheat
Wild carrot
Wild four-o'clock
Wild garlic
Wild geranium
Wild lettuce
Wild marigold
Wild mustard
Wild onion
Wild parsnip
Wild radish
Wild rape
Wild strawberry
Wild sweet potato
Wild vetch
Woodsorrel
Woolly croton
Woolly morningglory
Woolly plantain
Wormseed
Yarrow
Yellow rocket
Yellowflower pepperweed
and other broadleaf weeds

Do not allow people (other than applicator) or pets on treated area during application.
Do not allow people or pets to re-enter the treated area until spray has dried.

## IMPORTANT-Directions for Storage and Disposal

Do not contaminate food or feed by storage and disposal.

**PESTICIDE STORAGE**

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING**

**If Empty:**
- Non-refillable container. Do not refill or reuse empty container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

**If Partly Filled:**
- If it is necessary to dispose of unused product please call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark.
- Drift and runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.
- This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

3-21/32”

Page 5

6/28/11

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# BOOK INSIDE

3-7/32”

4-7/8”

**¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!**

## DATOS RÁPIDOS

- **Mata más de 200 malezas de hoja ancha**
- **No daña el césped†**
- **Trata 8,000 pies cuadrados (720 m²)**

| | |
|---|---|
| **MATA** | Más de 200 malezas de hoja ancha como el diente de león, trébol, capiqui y otras malezas de la lista. |
| **DÓNDE USAR** | **Sobre el césped**<br>†(Cuando se utiliza según las indicaciones. No utilizar sobre césped carpeta, dichondra o la variedad Floratam del pasto San Agustín). |
| **CUÁNDO USAR** | Cuando las malezas están en crecimiento activo. |
| **CUÁNTO USAR** | **Céspedes del norte:**<br>Cañuela, pasto azul de Kentucky y ballicos perennes.<br>**y céspedes resistentes del sur:**<br>Césped Bermuda, Búfalo y Zoysia.<br>Un cuarto trata 8,000 pies cuadrados (720 m²).<br>**No es necesario medir. Se diluye automáticamente.** |
| ☎ 💻 | Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en www.BayerAdvanced.com. |

**SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES**

**INGREDIENTES ACTIVOS:**

| | | |
|---|---|---|
| 2,4-D, sal dimetilamina | 7.59% | ESTE PRODUCTO CONTIENE: |
| Mecoprop-p, sal dimetilamina | 1.83% | 0,00427 lb equivalente ácido 2,4-Diclorofenoxiacético por fl.oz. o 6,30% |
| Dicamba, sal dimetilamina | 0.84% | 0,00102 lb equivalente ácido Mecoprop-p por fl. oz. o 1,51% |
| **OTROS INGREDIENTES** | 89.74% | 0,00047 lb equivalente ácido Dicamba por fl. oz. o 0,69% |
| **TOTAL** | 100.00% | Isómero específico según los métodos AOAC. |

Page 6

## INDICACIONES DE USO

**Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.**
**Lea y siga detenidamente las instrucciones de la etiqueta.**
**No aplicar este producto de manera que entre en contacto con personas o mascotas, directamente o a través del escurrimiento. Mantener a las personas y a las mascotas alejadas del área durante la aplicación.**
**No usar sobre césped que se cultive para la venta o uso comercial, como los panes de césped, ni para la producción de semillas comerciales, ni para fines de investigación.**
**No aplicar sobre ningún tipo de sistema de irrigación.**

### ANTES DE USAR

**Leer y seguir estas indicaciones de uso.**

- No aplicar directamente o cerca del agua, bocas de tormenta, canales de desagüe, alcantarillas o zanjas. No aplicar dentro de los 25 pies de distancia de ríos, estanques, lagos, arroyos, represas, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No aplicar cuando hay viento. Para evitar que el producto se escurra, no regar en exceso el área o áreas tratadas hasta el punto de escurrimiento ni aplicar cuando llueve o cuando se esperan lluvias para ese día. Enjuagar el aplicador solamente sobre el área del césped o jardín.
- Rociar cuando se espera que la mayor parte del día tenga una temperatura inferior a 90 º F (32 º C).
- No usar este producto sobre plantas favoritas ni en sus cercanías ya que pueden ser dañadas, incluso si se encuentran dentro de la línea de goteo de árboles y arbustos.
- La cantidad máxima de aplicaciones al voleo por sitio de tratamiento es de dos por año.

### CÓMO USAR

**Agitar bien antes de usar**

**CONEXIÓN**
1. Agitar bien antes de usar.
2. Conectar el rociador a la manguera de jardín.
3. Abrir el grifo de agua.

**PARA ROCIAR**
1. Extender la manguera hasta el área más lejana a tratar y apuntar la boquilla del rociador hacia el área a rociar.
2. Comenzar a rociar. Presionar la lengüeta de cierre utilizando la mano libre para girar la válvula del rociador a la posición “ON”.
3. Caminar a paso lento constante a medida que rocía, utilizando un movimiento de barrido parejo y superponer levemente las áreas tratadas. Trabajar de espaldas al grifo para evitar caminar sobre áreas mojadas ya tratadas.

**AL FINAL**
1. Para dejar de rociar, presionar la lengüeta de cierre utilizando la mano libre para girar la válvula del rociador a la posición “OFF”.

*(continuación)*

3-21/32”

Page 7

6/28/11

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# BOOK INSIDE

3-7/32”

## INDICACIONES DE USO *(continuación)*

### CÓMO USAR *(continuación)*

**AL FINAL**

2. Cerrar el grifo de agua.
3. Reducir la presión de agua de la manguera girando el rociador nuevamente a la posición “ON” hasta que el agua lentamente gotee y luego girar el rociador a la posición “OFF”.
4. Desconectar el rociador de la manguera del jardín.

**Restricciones de aplicación:**

- Limitado a **2 aplicaciones por año** con un **intervalo de 30 días** entre aplicación.
- **Proporción máxima de aplicación simple** de 8,0 onzas fluidas/1.000 pies cuadrados (1,47 lbs de equivalente ácido de 2,4-D, 0,35 lb de equivalente ácido de MCPP-p y 0,16 lb de equivalente ácido de dicamba por acre con cada aplicación).
- **Porcentaje máximo de temporada:** de 16,0 onzas fluidas./1.000 pies cuadrados (2,94 lbs de equivalente ácido de 2,4-D, 0,71 lb de equivalente ácido de MCPP-p y 0,33 lb de equivalente ácido de dicamba por acre con cada aplicación).

## CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

### CÓMO APLICAR

1. Extender la manguera hasta la planta a tratar más alejada y trabajar hacia el grifo para evitar el contacto con las plantas tratadas, mojadas.
2. Caminar a paso lento constante a medida que rocía, utilizar un movimiento de barrido parejo y superponer levemente las áreas tratadas.

### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Aplicar cuando las malezas son jóvenes y están en crecimiento activo.
- Si el césped está seco, regar 24 horas antes de usar este producto.
- El agua de lluvia o riego una hora después de la aplicación no afectará la efectividad del producto.
- Aplicar de 1 a 3 días después de segar.
- Es posible que determinadas malezas difíciles de eliminar deben volver a tratarse en 30 días de forma localizada.
- No aplicar sobre el césped nuevo hasta que haya alcanzado una altura mínima de 2 pulgadas (5 cm).
- Los puntos descubiertos pueden sembrarse de 3 a 4 semanas después de la aplicación.

### CÓMO FUNCIONA ESTE PRODUCTO

Este producto es un herbicida selectivo: elimina las malezas del césped en forma selectiva sin dañar el césped. Es una mezcla de herbicidas probados diseñados para atacar las malezas de hoja ancha como el diente de león, trébol y capiqui.

## MATA

**Trébol amarillo**
**Aster**
**Rorippa austriaca**
**Galium**
**Aceitilla**
**Stachys floridana**
**Manto blanco**
**Vicia cracca** *(continuación)*

Page 8

## MATA *(continuación)*

**Berro de altura**
**Falso berro**
**Helenium tenuifolium**
**Alma del poeta**
**Lupilina**
**Mostaza negra**
**Plántago rugelii**
**Cardo santo**
**Hierba de la cucaracha**
**Lechuga azul**
**Verbena azul**
**Plántago aristata**
**Cotula**
**Cardo perruno**
**Lengua de vaca**
**Plántago mayor**
**Gutierrezia dracunculoides**
**Tritogonia verrucosa**
**Llantén menor**
**Hierba velluda**
**Cardo negro**
**Mala mujer**
**Trébol de carretilla**
**Bardana**
**Ortiga mayor**
**Cadillo**
**Celidonia menor**
**Hierba del soldado**
**Calcida vera**
**Geranio**
**Verdolaga alfombra**
**Galium aparine**
**Hierba gatera**
**Hierba del halcón**
**Capiqui común**
**Cerastium vulgatum**
**Endivia**
**Tormetilla**
**Trébol encarnado**
**Trifolium agrarium**
**Trébol rojo**
**Trébol fresa**
**Trébol dulce**
**Trébol blanco**
**Berbecho**
**Bardana menor**
**Barbasco**
**Pilea nummulariifolia**
**Lysimachia nummularia**
**Vira vira**
**Romaza**
**Margarita menor**
**Erigeron philadelphicus**
**Margarita mayor**
**Diente de león**
**Dichondra**
**Verdolaga de la montaña**
**Manzanilla cimarrona**
**Sombrerito de agua**
**Baya del saúco**
**Falso diente de león**
**Camelina**
**Falso girasol**
**Amsinckia menziesii var**
**Botoncillo**
**Carraspique**
**Galinsoga**
**Abrojos**
**Vara de oro**
**Hiedra de tierra**
**Pegapega**
**Rama negra**
**Flor de peña**
**Cola de ratón**
**Cinquillo**
**Aster ericoides**
**Campanilla blanca**
**Erísimo**
**Cáñamo común**
**Ortiga mansa**
**Antoñico**
**Llantén media**
**Verbena stricta**
**Solanum de Carolina**
**Belladona**
**Escleranto**
**Sanguinaria**
**Morenita**
**Cenizos**
**Lespedeza**
**Malva**
**Escobilla**
**Caperonia castaneifolia**
**Astrágalo**
**Campanilla**
**Oreja de ratón**
**Artemisa**
**Cardo pendiente**
**Mostaza**
**Plántago de hoja delgada**
**Veza común**
**Ortiga**
**Naranja de la vellosilla**
**Bardana menor**
**Oxalis**
**Alquimila arvense**
**Chirivía**
**Sagina procumbens**
**Carraspique**
**Obolaria virginica**
**Lentejilla**
**Bledo**
**Pineywoods Bedstraw**
**Coreopsos tinctoria (pilosa de Bidens)**
**Plántago**
**Hiedra venenosa**
**Roble venenoso**
**Hierba carmín**
**Diosa teres**
**Girasol silvestre**
**Lactuca serviola**
**Afata hembra**
**Centinodia**
**Bledo rojo**
**Hierba de golondrina**
**Verbena bracteata**
**Abrojos**
**Verdolaga**
**Ambrosía**
**Rumex acetosella**
**Yuyo colorado**
**Alfilerillo**
**Potentilla norvegica**
**Erigeron asperugineus**
**Axyris amaranthoides**
*(continuación)*

4-7/8”

3-21/32”

Page 9

6/28/11

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB
# BOOK INSIDE

3-7/32”

## MATA *(continuación)*

| | | |
|---|---|---|
| Cardo ruso | Verbena lila | Ajo silvestre |
| Pimpinela escarlata | Pamita | Geranio silvestre |
| Cardo escocés | Polígono anfibio | Lechuga silvestre |
| Amargosa | Cardo | Caléndula silvestre |
| Bolsa del pastor | Coronilla varia | Mostaza silvestre |
| Plantago heterophylla | Nabo chileno | Cebolla silvestre |
| Galinsoga parviflora | Quelite | Chirivía silvestre |
| Rumex altissimus | Malva blanca | Rábano silvestre |
| Amaranthus hybridus | Hibisco | Colza silvestre |
| Acedera | Diodia virginiana | Fresa silvestre |
| Achicoria | Parra virgen | Batata silvestre |
| Bidens bipinnata | Lentejilla | Vicia americana |
| Verónica | Centella asiática | Oxalis montana |
| Bledo espinoso | Wavyleaf Bullthistle | Croton capitatus |
| Cepa caballo | Clemátide | Palo de rosa |
| Cerraja brava | Salsafi | Hierba del pastor |
| Pasto del chancho | Mostaza blanca | Chenopodium aristatum |
| Euphorbia maculata | Aster silvestre | Milenrama |
| Soliva sessilis | Enredadera (Polygonum convolvulus) | Hierba de Santa Bárbara |
| Ortiga mayor | Zanahoria silvestre | Mastuerzo y otras malezas de hoja ancha |
| Fresa de la India | Maravilla | |
| Urtica procera | | |

No permitir a las personas (excepto al aplicador) ni a las mascotas ingresar al área tratada durante la aplicación.
No permitir que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el aerosol se haya secado.

## IMPORTANTE: Indicaciones de almacenamiento y eliminación

**No contaminar alimentos ni forraje al almacenar o desechar el producto.**

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA**

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento.

**DESECHO DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR**

**Si está vacío:**
- Contenedor no reusable. No volver a llenar ni utilizar este contenedor.
- Colocar el contenedor en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

**Si está parcialmente lleno:**
- Si es necesario eliminar el producto sin utilizar, llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación.
- Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

Page 4

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

## DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

### RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede afectar a plantas que no son el objetivo del tratamiento. No aplicar directamente sobre el agua, o en lugares donde haya agua en la superficie, o en áreas donde haya marea por debajo de la marca media de la altura del agua.
- La deriva y el residuo líquido pueden ser perjudiciales para los organismos acuáticos que se encuentran en las aguas adyacentes a las áreas tratadas.
- Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida se filtre o ingrese a las bocas de tormenta, desagües, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidades de lluvia para las próximas 24 horas ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área tratada. Enjuagar el equipo de aplicación usado sobre el área tratada evitará que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.
- Esta sustancia química tiene propiedades y características relacionadas con las sustancias químicas que se encuentran en las aguas subterráneas. El uso de esta sustancia en áreas donde los suelos son permeables, en particular donde la capa freática es poco profunda, puede causar contaminación de las aguas subterráneas. La aplicación en cercanías a un tanque de agua o pozo puede contaminar el agua potable o las aguas subterráneas.

### PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Nocivo si se absorbe por la piel o se ingiere
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Al utilizar este producto, usar camisa de mangas largas, pantalones largos, medias, zapatos y guantes de goma.

**Después de utilizar este producto:**
- Enjuagar los guantes antes de quitárselos.
- Quitarse la ropa y lavarla en forma separada antes de volver a usar.
- Lavarse las manos prolijamente con agua y jabón.
- Si el producto entra en contacto con la ropa, quitarse la ropa lo antes posible y ducharse.

4-7/8”

3-21/32”

Page 5

6/28/11