

(*PLAGUE*)

역병

하와이 주 보건부

www.hawaii.gov/doh

더 자세한 문의 혹은 추천

전화 2-1-1

전염병증상은 무엇인가?

페렴 전염병의 증상들은 노출의 1-6 일안에 보통 나타난다 그것은 열 두통 허약 빠르게 진전하는페렴, 숨가쁨, 가슴통증, 기침, 피섞인 물같은 가래(어떤경우는) 초기 치료 없이는 이질병은 호흡기관 기능 마비를 야기한다 선페스트는 증상이 보통 노출 후에 2-6 일안에 나타난다 아프고 붓는 임파선 열 냉기 빠른충격 초기 치료하지 않으면 사망의 원인이 된다

더 자세한 문의는 알로하 유나이티드 웨이러 전화 2 1 1

www.hawaii.gov/doh or www.cdc.gov

주지사: 린다 링글

보건부 이사 치요메 후키노 (의사)

보건부는 인종 피부색갈, 출신(언어포함), 나이 성별, 종교, 장애에 관계없이 평등하게 이프로그램과 활동을 참여 하도록 제공한다
확정적인 행동 공무원에게 서신으로 혹은 전화 하십시오

box 3378 Honolulu HI 96801-3378 (808)586-4616(음성) (문제가 생긴 180 일 안에)

역병은 무엇인가?

역병은 박테리아 여시니아에 의해 생기는 심각하게 전염하는 질병이다
이박테리아는 쥐종류와 그들의 쥐벼룩에서 자연적으로 발견된다 그리고 세계
많은 지역에서 발견된다 3 가지 종류가 있다

-페렴의 역병: 박테리아를 흡입했을 때 생긴다

-선페스트는 감염된 벌레가 사람을 물었을 때 생긴다 이것은 흔한 형태의
역병이다

-패혈증의 역병은 역병박테리아가 피안에서 증대될 때 발생한다 페렴 혹은
선페스트의 합병증이거나 자연적으로 발생할 수 있다

-역병은 어떻게 퍼지는가?

페렴역병은 역병박테리아가 허파에 감염될 때 생긴다 이것은 다음 경우 생길 수
있다

- 1) 역병박테리아가 생화학 테러 공격 동안 공기에 방출 되었을 때
- 2) 호흡기관 작은 방울이 페렴역병에 감염된 사람(동물)- 다른 사람에 의해
흡입 되었을 때 호흡기관 작은 방울이 기침과 재채기를 통해 가장 빨리
퍼진다 이방법으로 감염되는 것은 병자와 동물과 6 피이트 안에서
직접으로 접촉 했을 때 생긴다
- 3) 선페스트와 패혈병이 치료 되지 않으면 그병균은 허파로 퍼진다
선페스트는 감염된 벌레가 사람들 혹은 동물들을 물었을 때 퍼진다 이병균은
사람에서 사람으로 퍼질 수 없다

-역병의 증상들은 무엇인가?

페렴역병의 증상들은 보통 노출의 1-6 일안에 나타난다 그것은 다음을 포함한다
열, 두통, 허약, 빠르게 발전하는 페렴, 숨가쁨, 가슴통증, 피쉬인 혹은 축축한
가래(어떤 경우)

초기 치료없이 이질병은 호흡기관 마비로 발전한다 선페스트는 증상이 보통
노출후 2-6 일안에 생기고 아프고 붓는 임파선, 열, 냉기, 빠른 충격등이 나타난다
이병은 초기에 치료 하지 않으면 사망을 유발한다

-역병은 어떻게 치료하는가?

