

(SMALLPOX)

천연두

하와이 주 보건부
www.hawaii.gov/doh
더 자세한 문의
전화 2-1-1

천연두들의 증상은 무엇인가?

천연두에 노출된 다음 7-17 일 잠복기간이 있다 이기간 동안 그사람은 전염성이 없다 증상이 시작되면 전염되기 쉬운것으로 간주한다 초기증상은 고열(101-104 화씨) 머리 몸 통증 구토 이초기증세 2-4 분후에 발진이 나타날것이다 이단계에 그사람은 전염성이 제일 높다 조그만 빨간점이 입안과 혀에 나타날것이다 그리고 머리와 손발(손바닥 발바닥) 이발진은 몸전체로 빠르게 퍼진다 다음 2 일에 걸쳐 발진은 성난 흑이되고 이흑은 짙고 불투명한 분비액으로 차게 될것이다 배꼽같이 중간부분이 움푹 들어가고 이흑은 작은 흑으로 되고 날카롭게 자라고 마치 피부밑에 둥근 물체가 있는것 같이 보통 둥그럽고 단단하게 생긴다 마침내 딱지들은 작은 흑위에 생기고 이딱지들은 얇은 자국이있는 상처를 남기면서 3 주정도후 떨어질것이다

더자세한 문의는 알로하 유나이티드 웨이러 전화 2 1 1

www.hawaii.gov/doh or www.cdc.gov

주지사: 린다 링글

보건부 이사 치요메 후키노 (의사)

보건부는 인종 피부색갈, 출신(언어포함), 나이 성별, 종교, 장애에 관계없이

평등하게 이프로그램과 활동을 참여 하도록 제공한다

확정적인 행동 공무원에게 서신으로 흑 전화 하십시오

box 3378 Honolulu HI 96801-3378 (808)586-4616(음성) (문제가 생긴 180 일 안에)

천연두는 무엇인가?

천연두는 매우 심각하고 매우 전염성이 높다 때대로 사망하는 전염병이다
이질병은 성공적인 예방접종 프로그램으로 1970 년후반에 뿌리채 제거 하였다
규칙적 천연두 예방접종이 없어졌기 때문 일반인은 이병에 대한 면역이 없다

-천연두의 증상은 무엇인가?

천연두에 노출된후 7-17 일 잠복기간이 있다 이기간에는 전염되지 않는다 증세가
시작되면 그사람은 전염성이 있는 것으로 고려한다

초기증세는 고열(101-104 도 화씨) 머리와 몸 통증 구토 (때로는) 초기증세후 2-
4 일에 발진이 생길 것이다 이단계에 그사람은 전염성이 제일 높다 조그만
빨간점이 처음에는 입과 혀바닥에 생기고 다음 머리와 손발(손바닥 발바닥)
발진은 빠르게 몸전체로 퍼질것이다

다음 2 일동안 발진은 자라는 흑이 될것이고 그흑은 짙고 불투명한 분비액으로
찰것이고 배꼽같이 중간이 움푹 들어갈것이다

이흑은 조그만 흑이되고 빠르게 자라고 마치 피부밑에 조그만 둥근 물체가
있는것 같이 만질만하게 둥글고 단단하게 형성된다

딱지는 이조그만 흑위에 자리잡고 그딱지는 3 주후에 얇은 자국이 있는 상처를
내면서 떨어질것이다

-천연두는 어떻게 퍼지는가?

천연두는 그사람이 열이 있을때 전염성이 있으나 발진이 난후 처음 7-10 일 제일
감염되기 쉽다 감염된 사람은 마지막 천연두 딱지가 떨어질때까지 전염성을
갖는다 천연두는 감염된 몸의 분비물과 직접 접촉해서 퍼지거나 흑 침대나
옷같은 오염된 개인물건을 접촉하므로 옮긴다

드물게 천연두는 버스나 건물같은 장소에서 공기로 퍼진다 인간이 이질병의 주된
자연적 주인이다 천연두는 벌레나 동물에 의해 전염되지 않는것으로 전해진다

-어떻게 천연두는 치료되는가?

