

(VX)

## 브이엑스

하와이 주 보건부  
www.hawaii.gov/doh  
더 자세한 문의  
전화 2-1-1

### **브이엑스는 증상 무엇인가?**

콧물 축축한 눈, 조그만 핀끝의 눈동자, 눈통증, 희미한 시력, 침, 심한땀, 기침, 가슴이 단단함, 설사, 두통, 멀미, 구토 복용

더 자세한 문의는 알로하 유나이티드 웨이러 전화 2 1 1

www.hawaii.gov/doh or www.cdc.gov

주지사: 린다 링글

보건부 이사 치요메 후키노 (의사)

보건부는 인종 피부색갈, 출신(언어포함), 나이 성별, 종교, 장애에 관계없이  
평등하게 이프로그램과 활동을 참여 하도록 제공한다  
확정적인 행동 공무원에게 서신으로 혹은 전화 하십시오  
box 3378 Honolulu HI 96801-3378 (808)586-4616(음성) (문제가 생긴 180 일  
안에)

### **브이엑스는 무엇인가?**

브이엑스는 높은 독성의 신경화학 약품이다 그것은 냄새 맛이 없는 기름액체이며  
색깔에 황갈색이 있다

매우 느리게 증발하며 그것이 공기로 방출된후 땅위에 정체하고 지면에  
노출되어진다 브이엑스는 주로 액체노출 위험성을 가지고 있다

그러나 매우 높은 온도에서는 조그만 기체로 바뀔수 있다 브이엑스는 환경에서  
자연 발견되지 않고 그것은 주로 인공의 화학전쟁무기이다

### **브이엑스 노출의 증상은 무엇인가?**

낮고 적은 브이엑스양은 다음증세의 몇가지 혹은 모든 증세를 나타낸다(브이엑스 노출후 몇초안에 나타난다 브이엑스액체 노출후는 몇분부터 18 시간안에 증상을 나타낸다 )

콧물 축축한 눈, 조그만 핀끝의 눈동자, 눈통증, 희미한 시력, 침, 심한땀, 기침, 가슴이 단단함, 설사, 두통, 멀미, 구토 복용

많은 브이엑스 양의 노출은 다음을 야기한다

의식불명, 경련, 마비, 호흡기관 기능 마비로 사망

기침, 자극성,긴장, 기억손상이 나타나고 노출되고 회복후 6 주까지 지속된다

브이엑스는 몸안에서 천천히 분해된다 지속적 반복적 노출은 몸을 해롭게 하는것을 증가한다

#### **-어떻게 브이엑스에 노출되는다**

\*브이엑스가 공기에 방출되면 사람들은 피부접촉 눈접촉, 브이엑스 먼지를 들이 마시므로 노출될수 있다

\*사람들은 브이엑스에 의해 오염된 음식을 먹거나 물을 마시므로 노출될수 있다 혹은 피부에 오염된 물이 닿으므로 걸릴수 있다

\*브이엑스 기체에 접촉으로 브이엑스는 옷에 30 분 남아 있을수 있는데 그것이 다른 사람들에게 노출되는것을 유도한다

\*브이엑스기체는 공기보다 무거우므로 낮은 지역으로 가라앉는다 그리고 골짜기나 육지위에 노출되는 기회가 크다

\*브이엑스는 접촉된 물체에 여러날 머무를 수 있고 매우 추운 날씨에는 브이엑스는 여러달 머무를수 있다

#### **-당신이 노출이 된것을 어떻게 아는가?**

화학물질이 방출되는 동안 당신이 그곳에 있었으면 아마도 노출되었을 지 모른다 콧물 축축한눈 호흡곤란을 느끼면 노출 되었을 수 있다

#### **-브이엑스에 노출되었다고 생각하면 당신은 무엇을 해야 하는가?**

브이엑스가 방출된곳으로 부터 떠나라 그리고 맑은 공기를 마셔라 만약 방출이 밖이면 그곳을 떠나라 가장 높은 지역으로 올라가라

